

Die Darmreinigung mit Endofalk® - Hinweise für den Patienten

türkisch

Name des Patienten: _____


Untersuchung am _____ um _____ Uhr

Endofalk® İLE BARSAK TEMİZLİĞİ


Endofalk®, MacrogoPlu çeşitli tuzlardan oluşan bir karışımdır ve isotonik bir eriyiğin hazırlanmasında kullanılır. Barsakları iyice temizlemek için içilir. İçine aroma katmak (portakal-passion meyvesi aroması veya ananas-limon aroması) içilmesini kolaylaştırır. Bu eriyik içinde şeker bulunmaz. Barsak temizlenmesi esnasında tuz alma veya tuz kaybı hemen hemen olmaz, öyle ki su ve elektrolit durumu değişikliğe uğramaz.

İÇİLECEK ERİYİĞİN HAZIRLANMASI


2 poşet içeriği ile 1 litre içme eriyiği elde edilir.
Litre başına 2 poşet ölçüsünü katıyen değiştirmeyin.



2 poşet içeriğini bir sürahi veya şişe içine doldurun



Buna ½ litre ılık şehir suyu ilave edin ve eritin.



Tekrar ½ litre daha soğuk şehir suyunu ilave edin.

İçilecek eriyik buzdolabında soğutulabilir, çünkü bu şekilde tadı daha iyidir. İçecek 48 saat içinde tüketilmelidir.

ALMA ÖNERİLERİ

Lütfen içime hazır eriyiği açıklandığı şekilde size verilmiş olan Endofalk®-poşetlerinden hazırlayınız. 6 poşet Endofalk® ile 3 litre, 8 poşet Endofalk® ile ise 4 litre eriyik hazırlanabilir.



10 dakikada bir bardak

Eriyik, on dakikada bir olarak 200-300 ml'lik (takriben bir bardak) porsiyonlar halinde, hepsi bitene veya aptes berrak gelene kadar içilecektir.

Bu eriyiğin ikiye bölünerek içilmesini öneriyoruz. İlk muayene gününden önceki akşamüstü/akşam, geri kalan miktarı da muayene sabahı alın.

Doktorunuz tavsiye ederse, bunun tümünü muayene günü alabilirsiniz. Genel olarak muayeneden 4 saat önce içilir.

Endofalk® almadan 2-3 saat evvel katı besin almayın. Katı gıda maddelerini muayeneden sonra yiyebilirsiniz.

Endofalk® size çok az etkide bulundu ise, gerektiğinde temizliğin sıvı ile tamamlanması için doktora muayeneden evvel mutlaka haber verin.

Diyabetliler: Ekmek birimlerine (BE) sayma yapılmaz.

Doğum kontrol hapı alan bayanlar: İshal nedeniyle bu haplar yetersiz kalabilir. Fakat bu hapları muntazam almaya mutlaka devam edilmelidir.

Düzenli ilaç kullanan hastalar: Lütfen hekiminizi bilgilendiriniz, çünkü barsak temizlenmesi sonucunda önemli ilaçlar dışarı atılarak gerektiği gibi etki göstermeyebilirler.

Muayeneden bir gün evvel hazmı kolay yiyecekler yemek ve bol sıvı içmek (berrak içecekler ve çay) hazırlığa ve içilecek miktara olumlu etkide bulunabilir.

Cihaz kanallarının tıkanmaması ve bunun korunması için muayeneden beş gün evvel, kabuklu, çekirdekli gıda maddeleri (az öğütülmüş, buğdaydan yapılmış, besin maddeleri, üzüm, müsli, domates, fındık, haşhaş, kivi, fasulya, nohut, vs.) yemeyin.